

## **Domande frequenti della cittadinanza sui trattamenti adalticidi contro le zanzare**

### **Quando viene fatto il trattamento adalticida da parte della Ditta incaricata dal Comune?**

Viene effettuato solo in caso di eventi di rilevante interesse sanitario (ad esempio quando vi è un caso di Chikungunya, Dengue e Zika) dopo specifica valutazione da parte dell'Azienda USL competente e sulla base delle indicazioni del *Piano Regionale di prevenzione dalle arbovirosi* per limitare il numero di zanzare “adulte” nella zona individuata.

### **Come viene fatto il trattamento adalticida da parte della Ditta incaricata del Comune?**

Il trattamento adalticida può essere eseguito in due modi:

- dalla strada e verso le proprietà private con automezzi dotati di nebulizzatori a basso volume; la profondità di penetrazione del prodotto nell'area privata si aggira sui 5 metri circa.
- con interventi “porta a porta” quindi la Ditta incaricata accede alle proprietà private ed esegue l'adalticida direzionando il prodotto nelle siepi e ove ritenga necessario (es materiale accatastato), ma sempre e comunque solo nelle aree esterne.

### **Dove viene fatto il trattamento adalticida?**

Nelle aree verdi, negli alberi, nelle siepi e in presenza di materiale accatastato dove le zanzare possono rifugiarsi, ma sempre in modo mirato.

### **Come mai il trattamento adalticida viene fatto solo in questa zona?**

L'area del trattamento di disinfestazione straordinaria viene definita secondo le indicazioni dell'Azienda USL e sulla base dei *Piano Regionale di prevenzione dalle arbovirosi*, e SOLO in prossimità dei casi sospetti/accertati di malattia:

- se c'è un singolo caso di **Chikungunya, Dengue e Zika virus** la disinfestazione di norma viene fatta in un'area di raggio 100 metri dall'abitazione e/o dal luogo in cui la persona ha soggiornato che possono diventare 200 metri se la zona è scarsamente abitata;
- se ci sono più casi di **Chikungunya, Dengue e Zika virus** (Cluster), sulla base delle valutazioni dell'AUSL viene disposta la disinfestazione in un raggio di 300 metri;

### **Come vengono eseguiti gli interventi dentro l'area individuata (es nel cerchio di 100 metri di raggio) per i casi di **Chikungunya, Dengue e Zika virus**?**

- per tre notti consecutive viene eseguito il trattamento adalticida dalla pubblica via e verso le proprietà private come sopra descritto;
- di norma il giorno successivo al primo trattamento adalticida la ditta esegue un “porta a porta” presso tutte le aree che sono state individuate e che sono ricomprese dentro il cerchio; in questa occasione la ditta effettua l'adalticida nelle aree private, rimuove tutti i possibili focolai (es sottovasi) e tratta con prodotto larvicida i pozzetti privati;
- viene anche eseguito un ulteriore trattamento larvicida nei pozzetti pubblici della zona.

### **Perchè non fate i trattamenti adalticidi in tutta la città?**

I trattamenti adalticidi vengono effettuati per abbattere la popolazione di zanzare adulte e non consentono la rimozione dei focolai larvali dove le zanzare si riproducono (es le raccolte d'acqua); hanno quindi *un effetto limitato nel tempo*.

Gli interventi con prodotti adalticidi sono considerati trattamenti di carattere eccezionale che devono essere utilizzati per casi sporadici ovvero *per ragioni di tutela della salute pubblica* o nel caso di infestazioni particolarmente intense in siti sensibili come le scuole, gli ospedali etc.

Le ragioni risiedono nella necessità di limitare la “pressione” di questi prodotti sulle zanzare affinché possano essere efficaci per le situazioni di emergenza sanitaria ed anche perché non sono prodotti selettivi nei confronti degli insetti utili (come le api) ed ancora non sono esenti da possibili effetti sulla salute umana, specie per i bambini.

### **Perché non siamo stati avvisati prima dell’esecuzione del trattamento adalticida?**

Il Comune ha 24 ore di tempo, dalla comunicazione dell’AUSL della presenza di un caso sospetto o confermato di malattia, per avviare le operazioni di disinfestazione e quindi i tempi per avvisare la popolazione sono veramente stretti.

### **Come mai ci sono questi casi di malattia nel nostro territorio?**

Le persone vivono e/o viaggiano in zone dove alcune di queste malattie sono endemiche o epidemiche; la zanzara purtroppo è il vettore potenziale della trasmissione di questi virus.

### **Come si trasmettono questi virus?**

[vedere il sito zanzara tigre on line della Regione](#)

### **Che tipo di prodotti vengono utilizzati per gli interventi adalticidi?**

- Piretro Safe Ec – presidio medico chirurgico – a base di estratto di piretro ([vedi scheda tecnica e scheda di sicurezza](#))
- Permex 22E - presidio medico chirurgico - a base di permetrina ([vedi scheda tecnica e scheda di sicurezza](#)).

### **Quali sono le principali misure da osservare nel caso di trattamenti adalticidi?**

- devono essere eseguiti in assenza di persone e animali nelle aree esterne
- occorre chiudere porte e finestre
- spegnere i condizionatori
- non esporre indumenti e alimenti
- coprire ortaggi/frutteti pronti per il consumo; se non è possibile, evitare il consumo di tali prodotti per almeno 3 giorni dal trattamento e lavare accuratamente prima del consumo
- rimuovere ciotole degli animali
- è consigliato, per quanto possibile, sostare in modo stabile nelle aree esterne dopo almeno 48 ore dall’intervento
- è necessario far frequentare l’area trattata dai bambini dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione
- occorre coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti in giardino compresi i giochi dei bambini
- è necessario coprire con teli laghetti, vasche e fontane.

### **Sono un pubblico esercizio che si trova nella zona oggetto di intervento di disinfestazione ed ho all’esterno tavoli/sedie; come posso fare?**

Si consiglia di coprire con teli di nylon le sedie ed i tavoli posti all’esterno oppure lavarli la mattina successiva avendo l’accortezza di indossare guanti in plastica.

### **Come si possono proteggere gli ortaggi ed i frutteti durante gli interventi adalticidi?**

Se gli ortaggi ed i frutteti si trovano vicino alla strada è bene coprirli con un telo di plastica.

### **Se non è possibile proteggere ortaggi e frutteti come si può fare?**

Il prodotto non ha un periodo di “carenza consigliato” prima del consumo di frutta e verdura, in quanto è un presidio medico e non un prodotto per l’agricoltura. Meglio attendere almeno 3 giorni prima di consumare i prodotti e lavarli accuratamente. Se l’orto si trova dietro casa ad una distanza superiore ai 5 metri non sarà interessato dal trattamento.

### **Come devono essere gestiti gli animali?**

È necessario proteggerli e metterli al riparo durante l'esecuzione del trattamento adulticida quindi dalle ore 23 alle ore 7 e rimuovere le ciotole del cibo e dell'acqua prima del trattamento.

### **Quando possono uscire dal riparo gli animali?**

Dal termine delle operazioni quindi dalle ore 8 del mattino.

### **Se il gatto/la tartaruga/il coniglio/le galline mangiano l'erba il giorno seguente al trattamento cosa succede?**

Per precauzione meglio tenerli in casa per 48 ore.

### **Come si possono proteggere le tartarughe?**

Al chiuso o con un telo e prima di metterle all'esterno è opportuno lavare l'erba!

### **Gli insetticidi spray in bomboletta in vendita nei supermercati si possono usare?**

Sì

### **Vorrei fare un adulticida nella mia area esterna. Come mi devo comportare?**

[vedere la pagina apposita](#)

### **Posso fare un intervento adulticida al mese nel mio giardino?**

Gli interventi adulticidi "a programma" non sono consentiti; può essere necessario effettuare un intervento adulticida se l'infestazione è particolarmente intensa. Il parametro indicato dalle Linee Guida Regionali per valutare se l'infestazione è particolarmente intensa è il seguente: se in 15 minuti di esposizione in giardino oltre 10 zanzare tentano il pasto di sangue l'infestazione si può considerare intensa.

Raccomandazione: il trattamento adulticida ha una limitata efficacia nel tempo quindi per non dover ripetere il trattamento occorre eseguire un'accurata ispezione del proprio giardino e trovare/eliminare tutti i ristagni d'acqua. Utilissimo chiedere la collaborazione dei propri vicini di casa per la gestione delle aree esterne private.

Se rimuoviamo i focolai larvali (le raccolte d'acqua) eliminiamo anche la possibilità che altre zanzare nascano; per i pozzetti occorre fare i trattamenti periodici con prodotto contro le larve di zanzara o inserire una zanzariera.

### **I divieti e le norme previste nell'ordinanza del Sindaco per i trattamenti adulticidi valgono anche per i trattamenti che fanno gli agricoltori nei frutteti/nei campi?**

No, gli agricoltori – al di fuori delle aree delle proprie abitazioni - sono tenuti al rispetto delle norme previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN.

### **Come possiamo proteggerci?**

Partecipando alla lotta contro le zanzare nelle proprie aree private e proteggendosi dalle punture delle zanzare. ([vedere materiale informativo](#))

S:\Emergenze\1-EMERGENZE SANITARIE\2019\FAQ - DOMANDE FREQUENTI\Domande frequenti - FAQ -  
aggiornamento 2019.odt